

Naphthalene poisoning

تسمم النفثالين

حالة تسمم النفثالين لازم تتحول لأقرب مستشفى أو مركز سموم بعد الرعاية الأولية

1. غسيل معدة
2. Zantac ampoule حقنة واحدة وريد أو عضل
3. Solucortef vial حقنة واحدة وريد أو عضل

Hydrocarbon ingestion

Source

البنزين - الكيروسين - الجاز - السولار - التندر

Management

لازم الحالة تتحول للمستشفى أو مركز السموم بعد الرعاية الأولية

1. General & supportive measures (as before)

1. يجب العناية بالتنفس و تحويل الحالة عند الحاجة لأنبوبة تنفسية أو تنفس صناعي
2. لو على هدومه يقلعها و يستحمي لو على جلده و حول الفم يتغسل بمية و صابون
3. (نصف كوب في الأطفال) كوب من اللبن البارد شرب
4. إحداث قيء - غسيل المعدة ممنوع
5. استنشاق أوكسجين
6. جرعة من الملين
7. Ventolin inhaler بختين / ٦ ساعات لتوسعة الشعب الهوائية
8. Zantac ampoule حقنة عضل أو وريد
9. Solucortef vial (3.5 LE) حقنة وريد أو عضل / ٦ ساعات لمدة يومين
10. Penicillin G vial (2.5 LE) حقنة واحدة عضل